Equino

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS



s.p.® veterinaria

Orales

ESPECIALIDADES VETERINARIAS NO SUJETAS A PRESCRIPCIÓN
EXCEPTO LOS MARCADOS CON (#)

SIN RECETA* VETERINARIA

ESVEX ORAL

Vitamina E ..... 100 g/1000ml Selenito sódico 50 mg/1000ml	Suspensión oral	5 l	Todas las especies 0,5-1 ml/ litro de agua de bebida.	No precisa	

HEPATOREN

L-Carnitina HCl.....50 g/1000ml DL-Metionin.....15 g/1000ml L-Lisina HCl.....10 g/1000ml Cloruro de Colina.....50 g/1000ml Vitamina B12.....10 mg/1000ml Manitol.....65 g/1000ml Sorbitol.....100 g/1000ml Cloruro sódico.....100 g/1000ml Cloruro potásico.....75 g/1000ml	Solución oral (Pienso comple-mentario)	100 ml 5 l	Todas las especies 1 ml/ litro en agua de bebida.	No precisa	

HIDRO REX VITAL AMINOÁCIDOS

Vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina K3, ácido Fólico, ácido Nicotínico, Pantotenato de calcio y Aminoácidos	Solución oral	100 ml 1 l 5 l	Todas las especies 0,5- 1 ml./ litro de agua. Ver especificaciones	No precisa	

NEMICINA (#)

0402-ESP

Neomicina (sulfato).....185.000 Ul/g	Polvo para solución oral	1 kg	Equinos - 0,2- 0,4 g/ litro, 3- 5 días. Porcino - 1 g/ litro, 3- 5 días. Terneros - 0,4- 1 g/ litro, 3- 5 días. Perros - 0,4- 1 g/ litro, 3- 5 días. Aves - 0.5-0.7 g/ litro, 3- 5 días. Ver especificaciones	Potros: 20 días Terneros: 30 días Porcino: 20 días Pavos: 14 días Pollos: 5 días	

OSMOLAR ORAL

Lactosa; dextrosa; cloruro sódico; cloruro potásico; lactato cálcico (E-327) 30,8 g; cloruro de colina (3a 890) 1,5 g; ácido fólico (3a316), L-lisina (3.2.1.) 10 g; L-arginina (3 c361) 20 g.	Polvo soluble (Pienso Comple-mentario)	1 kg	Equidos, rumiantes, porcino y conejos - 0,5 - 1 g/ litro agua, 3 días. Aves - 2 g/ litro agua, 3 días.	No precisa	

RESPIVEX

Thymus vulgaris, Mentha piperita, Aceite de eucalipto	Solución oral (pienso comple-mentario)	1 l 5 l	Todas las especies 0,25-0,5 ml/ litro agua de bebida	No precisa	

REX VITAL AMINOACIDOS

Vitamina A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, K3, ácido fólico, ácido Nicotinico, Pantotenato de calcio y Aminoácidos	Polvo soluble (Pienso Comple-mentario)	1 kg	Todas las especies - 0,5-1 g/ litro agua, durante 5-7 días	No precisa	

REX VITAL AMINOACIDOS PREMIX

Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina K3, ácido Fólico, ácido Nicotínico, Pantotenato de cal y Aminoácidos	Premezcla	25 kg	Rumiantes, porcino y aves - 1- 2 kg/ t de pienso, durante 1 semana.	No precisa	

SOLUCALM

Cloruro magnésico, Vitamina B6, Nicotinamida, L-triptofano, Passiflora incarnata, Melissa officinalis	Solución oral (Pienso comple-mentario dietético)	1 l 5 l	Todas las especies - 0,5- 1 ml/litro agua de bebida	No precisa	

Inyectables

ESPECIALIDADES VETERINARIAS NO SUJETAS A PRESCRIPCIÓN
EXCEPTO LOS MARCADOS CON (#)

SIN RECETA* VETERINARIA

ADEX-3 Emulsión inyectable (#)

3645-ESP

Vitamina A ..... 50.000UI/ml Vitamina D3..... 25.000UI/ml Vitamina E ..... 20 mg/ml	Emulsión inyectable	250 ml	Caballos y Potros - 1-2 ml/ animal Bovino: Terneros - 1 ml/ animal, Novillos - 1-2 ml / animal, Adultos - 2 ml/ animal. Porcino: Lechones - 0,5 ml/ animal, Cebo - 1 ml/ animal, Reproductores - 1 ml / animal. Ovino y Caprino - 1 ml/ animal. Dosis única en todas las especies.	**Carne:** 28 días **Leche:** 0 días	

DEXAVEX 2 mg/ml Solución inyectable (#)

2693-ESP

Dexametasona (fosfato sódico)....0,2 %	Solución inyectable	50 ml	Equino - intravenosa, intramuscular e intrarticular: 1,5 ml/50 kg p.v. se puede repetir cada 24-48 h. Bovino y porcino - Intramuscular: 1,5 ml/50 kg p.v. se puede repetir cada 24-48 h. Perros y gatos - Intramuscular: 0,5 ml/10 kg p.v. se puede repetir cada 24-48 h.	**Carne:**Equino: 8 días. Bovino: 8 días. Porcino: 2 días **Leche:** Yeguas: No usar en animales cuya leche se destina al consumo humano. Bovino: 72 horas	

FLUVEX 50 mg/ml Solución inyectable para porcino, bovino y EQUINO (#)

1.755-ESP

Flunixin (meglumine).....5%	Solución inyectable	100 ml 250 ml	Equino - 1 ml/ 45 kg p.v. día Bovino - 2 ml/ 45 kg p.v. día Porcino - 2 ml/ 45 kg p.v. día	**Carne:** Equino: 4 días. Bovino: 4 días Porcino: 28 días **Leche:** Yeguas: No usar en animales cuya leche se destina al consumo humano. Bovino: 24 horas	

OXIVEX 10 UI/ml Solución inyectable (#)

2254-ESP

Oxitocina.....10 UI/ml	Solución inyectable	100 ml 250 ml 500 ml	Obstetricia Yeguas - 7,5-15 ml/yegua Cerdas - 3-5 ml/cerda Vacas - 7,5-10 ml/vaca Eyección láctea Yeguas y vacas - 1-2 ml/animal Cerdas - 0,5-2 ml/animal	Yeguas, vacas y cerdas **Carne:** 0 días **Leche:** 0 días	

PENIVEX COMPLEX Suspensión inyectable (#)

942-ESP

Bencilpenicilina procaína .... 20MUI/100ml Dihidroestreptomicina (sulfato) 20 g/100ml	Suspensión inyectable	100 ml 250 ml	Equino, bovino, ovino y porcino - 0,3- 0,6 ml/10kg p.v./ día. Perros y gatos - 0,05- 0,1 ml/ kg p.v./ día.	**Carne:** 30 días **Leche:** 3 días. No usar en équidos cuya carne se destine al consumo humano	

TRIMACROL GAN Suspensión inyectable (#)

0928-ESP

Sulfadiazina (sódica).....400 mg/ml Trimetoprim.....80 mg/ml	Suspensión inyectable	100 ml 250 ml	Equino bovino, ovino, caprino y porcino - 0,5 ml/ 10 kg p.v.	Caballos: **Carne:** 42 días **Leche:** No usar en animales cuya leche se destina al consumo humano. Porcino: 15 días Bovino: **Carne:** 28 días **Leche:** 10 días Ovino: **Carne:** 15 días **Leche:** 7,5 días Caprino: **Carne:** 15 días **Leche:** no usar	

Sprays

ALUMINIUM SPRAY

563-H

Aluminio micronizado.....120 g (contenido neto)	Spray	270 ml	Mamíferos - Aplicar una fina capa a unos 20 cm. de distancia	No precisa	

DERMOVEX

03711-H

Aceite de ricino.....300 mg/ml Azufre.....1,2 mg/ml Aceite rosa mosqueta.....125 mg/ml	Aerosol tópico	335 ml	Mamíferos - Aplicar durante 1 o 2 segundos sobre la superficie de la piel limpia a proteger, manteniendo el envase a unos 20 cm de la piel. La aplicación del producto puede repetirse diariamente, a voluntad según las necesidades.	No precisa	

LARVAL S.P.

01098-P

Cipermetrina.....5 mg/ml	Spray	405 ml	Spray insecticida acaricida de uso ganadero.	No precisa	

Para obtener una información completa de cada producto, diríjanse a nuestros comerciales de zona o la sección productos de nuestra página web ***www.spveterinaria.com*** EDICIÓN MARZO 2021.

Biocidas - Desinfectantes

ESPECIALIDADES VETERINARIAS NO SUJETAS A PRESCRIPCIÓN
EXCEPTO LOS MARCADOS CON (#)

SIN RECETA* VETERINARIA

GLIOX

01514-P

Glutaraldehído.....4 % Cloruro de didecil dimetil amonio.....10 % Glioxal.....3,2 %	Solución desinfectante	5 l	Desinfección de contacto: Locales, superficies, equipos, vehículos de transporte, etc. 0,5-1 lt/100 litros de agua para 1000 m² de superfície	No procede	

NOVIREX

0959-P

Cloruro didecil dimetil amonio.....10 % Glutaraldehido.....15 %	Solución desinfectante	5 l	Desinfección de instalaciones, material y medios de transporte. Activo frente a la Peste Porcina Africana (PPA) 0,3-0,5 l/100 litros de agua para 1000 m² de superfície	No procede	

YODO S.P.

8.152

Solución yodada de alcohol etoxilado.....125 mg (equivalente a 25 mg de yodo) Excipientes idóneos c.s.p. .....1 ml	Solución desinfectante	5 l	• Desinfección de suelos. paredes y techos: 70-75 ml Yodo S.P./10 litros de agua. • Desinfección equipos limpios: 17-18 ml Yodo S.P./10 litros de agua. • Pediluvios sanitarios: 70-75 ml Yodo S.P./10 litros de agua (renovar cada 48 h). • Desinfección heridas y baños pezones 1 l Yodo S.P. en 9 litros de agua. • Desinfección de aguas: 100-200 ml l Yodo S.P. /1000 litros de agua.	No precisa	

Biocidas - Plaguicidas

INSECTICIDA AZ05 (REVIOX A)

03902-P

Azametifos.....0,5 %	Insecticida polvo	1 kg 5 kg	Insecticida acaricida de uso ganadero para todo tipo de instalaciones (aplicación directa). Esparcir 20-25 g/m²	No procede	

INSECTIVEX 50 mg/ml (#)

798 ESP

Cipermetrina (55 Isómero cis: 45 trans).....50 mg	Solución insecticida en emulsión para pulverización cutánea (uso tópico)	250 ml 1 l	Insecticida de moscas, pulgas, ácaros y garrapatas: 20 ml/ litro de agua y aplicar cada 14 días. En **Équidos** y bóvidos adultos: 500 ml de la emulsión preparada. En Potros y terneros: 125 ml de la emulsión preparada. En Bóvidos jóvenes: 250 ml de la emulsión preparada.	**Carne:** Bovino:1 día **Leche:** Bovino: 0 días. No usar en équidos cuya carne se destine al consumo humano	

ISIVEX S.P.

0957-P

Cipermetrina.....10 % Tetrametrina .....6 %	Insecticida líquido	1 l 5 l	Insecticida líquido acaricida de uso ganadero. 5-10 ml/litro de agua para 100 m² de superficie. Repetir a los 15 días.	No procede	

LARVEX

0964-P

Diflubenzurón .....48 % P/V	Suspensión larvicida-ovicida	250 ml 1 l	Suspensión larvicida-ovicida de uso ganadero. 2-4 ml/litro de agua para 2m² de superficie	No procede	

LARVIVEX COMPLEX PLUS

2589-P

Cipermetrina.....15 % Diflubenzuron .....9 %	Insecticida líquido	250 ml 1 l	Insecticida ovicida, larvicida y adulticida de uso ganadero. - *Dosis de choque:* mezclar 5-10 ml/litro de agua (0,5%-1%) de LARVIVEX COMPLEX PLUS y aplicar - *Dosis de mantenimiento:* mezclar 2,5 ml/litro de agua (0,25%) de LARVIVEX COMPLEX PLUS y aplicar.	No procede	

PIREVEX PLUS

01198-P

Cipermetrina.....10 % p/v	Insecticida líquido emulsionable	1 l	Insecticida líquido acaricida de uso ganadero. 1-2 l/100 litros de agua. 5 litros emulsión preparada para 100 m² de superficie	No procede	

s.p.® veterinaria, s.a.

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4.1• 43330 RIUDOMS (Tarragona) • Tel. +34 977 850 170* • Fax +34 977 850 405 • Ap. Correos, 60

www.spveterinaria.com