

ESPECTRO DE ACCIÓN

ECTOPARÁSITOS	SENSIBLES A LA DELTAMETRINA
Moscas	Musca domestica, Stomoxys calcitrans, Haematobia irritans, Lucilia caprina, Lucilia sericata, Tabanus spp., Hydrotoea irritans, Melophagus ovinus
Garrapatas	Ixodes ricinus, Boophilus spp., Rhipicephalus spp.
Piojos	Damalinea ovis, Solenopotes capillatus, Lionognathus vituli, Lionognathus ovillus, Haematopinus eurysternus, Haematopinus suis
Mosquitos	Anopheles spp. (excepto A. taeniorhynchus), Culicoides spp. (Culicoides dewulf)

POSOLÓGIA (Dosis única).

Aplicar el producto vertiendo la dosis necesaria a lo largo de la línea dorsal, desde la cruz hasta la cola

INFESTACIONES	BOVINO	OVINO
Moscas y mosquitos	Hasta 100 kg p.v.: 10 ml / animal De 100 a 300 kg p.v.: 20 ml / animal Más de 300 kg p.v.: 30 ml / animal En caso de reinfestación, repetir cada 8-10 semanas	Melophagus ovinus: 10 ml / animal En caso de reinfestación, repetir cada 8-10 semanas
Garrapatas	15 ml / 100 kg p.v. Más de 500 kg p.v. : 75 ml / animal En caso de reinfestación, repetir cada 4-5 semanas	10 ml / animal En caso de reinfestación, repetir cada 4-5 semanas
Piojos	Hasta 500 kg p.v.: 10 ml / animal Más de 500 kg p.v.: 20 ml / animal En caso de reinfestación, repetir cada 8-10 semanas	10 ml / animal En caso de reinfestación, repetir cada 8-10 semanas

Composición: Deltametrina 7,5 mg / ml. **Especies de destino:** Bovino y Ovino. **Indicaciones:** Control de parasitosis externas causadas por moscas, garrapatas y piojos mencionados en el cuadro. **Posología y modo de administración:** Instrucciones mencionadas en el cuadro. **Contraindicaciones:** No se han descrito. **Efectos secundarios:** No se han descrito. **Interacciones e incompatibilidades:** No se han descrito. **Sobredosificación:** El modo de empleo hace improbable una intoxicación por sobredosificación, pero en caso de observarse algún síntoma (hiperexcitación, sialorrea, náuseas) dentro de las 48 horas posteriores al tratamiento, lavar al animal con agua abundante. **Precauciones especiales para su uso en animales:** Aplicación cutánea por unción dorsal continua (Pour-On). **Precauciones que debe tomar la persona que administre el producto a los animales:** Las personas que manipulen el producto deberán llevar guantes. En caso de contacto con los ojos o mucosas, lavar inmediatamente con agua abundante y avisar al médico. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. En caso de ingestión accidental, enjuagar la boca con agua abundante y avisar al médico. **Uso durante la gestación o la lactancia:** No se han descrito contraindicaciones durante estos periodos. **Tiempo de espera:** Bovino: Carne: 18 días, Leche: 12 horas. Ovino: Carne: 35 días, Leche: 11 horas. **Precauciones especiales de conservación:** No requiere condiciones especiales de conservación. Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Registro N°: 2578 ESP

 **s.p. veterinaria, s.a.**

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4.1 • 43330 RIUDOMS (Tarragona) • Tel. +34 977 850 170* • Fax +34 977 850 405 • Ap. Correos, 60
www.spveterinaria.com

Pour-on

DELTAVEX

Deltametrina 7,5 mg/ml

▶ La barrera protectora de larga acción contra ectoparásitos



**PROTECCIÓN
PROLONGADA**

Pour-on DELTAVEX


Previene las enfermedades transmitidas por garrapatas, piojos, moscas y mosquitos



DELTAVEX (DELTAMETRINA)
Alta eficacia insecticida, mucho mayor que el resto de piretroides sintéticos
Fuerte efecto de choque (knock-down), matando rápidamente los ectoparásitos por contacto
Actividad residual más prolongada que el resto de piretroides
Rápida y permanente difusión a través del tejido adiposo
Resistente a la Temperatura (termoestable), al sol (fotoestable) y a la lluvia
Actividad ovicida (previene la reinfestación por garrapatas)
Formulado con excipiente acuoso: mayor seguridad (no produce irritación de la piel y disminuye el riesgo de fotosensibilización)
Fácil aplicación e identificación de los animales tratados

ACTIVIDAD RESIDUAL EN EL CONTROL DE INFESTACIONES POR MOSCAS EN GANADO BOVINO

Reducción de la población de moscas sobre ganado bovino después de la administración de 30 ml de Deltavex Pour-on



- Tratar precozmente cuando aparezcan las primeras moscas y repetir el tratamiento en caso de reinfestación
- Tratar todos los animales independientemente de su edad y estado fisiológico
- Desinsectar todas las instalaciones con insecticidas apropiados (adulticidas y larvicidas)



2 MESES DE PROTECCIÓN ASEGURADA

Aumenta la productividad de su ganado