

DOXI-10 PREMIX

DOXICICLINA 10% PREMEZCLA

El tratamiento de
referencia frente al
complejo respiratorio porcino



¡RESPIRA!



s.p. veterinaria


DOXI-10 PREMIX

Máxima estabilidad, incluso en la granulación más exigente (hasta 80° C y 2,5 atm.)

Estabilidad de DOXI-10 PREMIX en pienso en harina




Estabilidad de DOXI-10 PREMIX tras granulación a 80... C y 2,5 atm.



Máxima eficacia frente a los Patógenos Respiratorios Porcinos

Curva de concentraciones plasmáticas medias de Doxiciclina respecto al tiempo en cerdos tratados con DOXI-10 PREMIX (250 ppm) durante 8 días, y Concentraciones Míximas Inhibitorias de los microorganismos diana.



Gracias a su excelente biodisponibilidad mantiene elevadas concentraciones en el organismo durante todo el tratamiento.

TIEMPO DE ESPERA

5 días

Estabilidad del 99,42% a los 3 meses en sacos abiertos

Homogeneidad en el pienso

	Concentración teórica (ppm)	Concentración real (ppm)	% real/teórico
Pienso 1	250	250,465	100,19%
Pienso 2	250	250,743	100,30%
Pienso 3	250	249,804	99,92%

Posee una ptima granulometría que garantiza su mezcla homogénea durante la fabricación del pienso.

Tratamiento de Complejo Respiratorio Porcino: 2,5 kg/t. de pienso (250 ppm.), durante 8 días.

DOXI-10 PREMIX, la doxiciclina es un antibiótico bacteriostático, que actúa interfiriendo la síntesis proteica bacteriana de las especies sensibles. Composición (para 1 g): Doxiciclina hidrato 100 mg, Excipiente c.s.p. 1g. Especies de destino e Indicaciónes: Porcino: Prevención y Tratamiento del Complejo Respiratorio Porcino causado por *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica* y/o *Mycoplasma hyopneumoniae*. Posología y modo de administración: 250 g de doxiciclina/t.pienso (250 ppm) durante 8 días, equivalente a 2,5 kg de DOXI-10 PREMIX/t.pienso. Puede incorporarse al pienso en forma de harina o de pellet, el cual se ha granulado con

vapor durante un máximo de 15 minutos a una temperatura no superior a 80... C y una presión de 2,5 atm. **Contraindicaciones:** No administrar a animales con hipersensibilidad a las tetraciclinas. No administrar a animales con alteraciones hepáticas. **Utilización durante la gestación y la lactancia:** la seguridad del producto no se ha demostrado en cerdas gestantes ni en cerdas en lactación por lo que recomienda no usarlo en estos animales. **Tiempo de espera:** 5 días. **Presentación:** sacos de 25 kg. **Registro n.º:** 1.726 ESP.

Distribución con receta veterinaria. Titular y fabricante: SP VETERINARIA, SA.



s.p. veterinaria, s.a.

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 - Ap. Correos, 60
Tel fono 977 850 170* - Fax 977 850 405
43330 RIUDOMS (Tarragona)
www.spveterinaria.com