NEMICINA
500.000 UI/g

POLVO PARA ADMINISTRACIÓN
EN AGUA DE BEBIDA O EN LECHE



la **salud**
empieza
por el
intestino

¡también
para
corderos!

s.p.® veterinaria

NEMICINA 500.000 UI/g

POLVO PARA ADMINISTRACIÓN EN AGUA DE BEBIDA O EN LECHE

COMPOSICIÓN

Principio activo:
Sulfato de neomicina.....500.000 UI

INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO

Tratamiento de infecciones intestinales causadas por *E. Coli*.
Porcino, terneros, corderos, pollos de engorde, gallinas ponedoras y pavos.

POSOLOGÍA Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Administración en agua de bebida o leche.

Porcino: 6500 UI sulfato de neomicina/kg peso vivo (p.v.) /día (equivalente a 13 mg de medicamento veterinario/kg p.v./día) (130 g Nemicina / 1000 L agua).
Terneros: 6500 UI sulfato de neomicina/kg peso vivo (p.v.) /día (equivalente a 13 mg de medicamento veterinario/kg p.v./día) (130 g Nemicina / 1000 L agua).
(0.6-1.0 g Nemicina /ternero 50-80 Kg/día).
Corderos: 6500 UI sulfato de neomicina/kg peso vivo (p.v.) /día (equivalente a 13 mg de medicamento veterinario/kg p.v./día) (130 g Nemicina / 1000 L agua en cebaderos).
(mezcla con leche en polvo, calcular según ingesta).
Pollos de engorde, gallinas ponedoras y pavos: 19500 UI sulfato de neomicina/kg peso vivo (p.v.) /día (equivalente a 39 mg de medicamento veterinario/kg p.v./día).
(20-400 g Nemicina / 1000 L agua).

TIEMPO DE ESPERA

Terneros, corderos y porcino:
Carne: 14 días
Pollos de engorde, gallinas ponedoras y pavos:
Carne: 7 días
Huevos: Cero días

Presentaciones:
1 Kg.
Nº de autorización:
4421 ESP



s.p.® veterinaria, s.a.
Ctra. Reus-Vinyols Km. 4.1 • 43330 RIUDOMS (Tarragona)
Tel. +34 977 850 170 • Ap. Correos, 60
www.spveterinaria.com

La información que contiene este folleto ha estado revisada por nuestro equipo técnico y pretende complementar el consejo del profesional veterinario. Para la información completa contacte con nuestros comerciales de zona o a la sección de productos de nuestra página web ***www.spveterinaria.com***