TUDOMAX

10 mg/g

BROMHEXINA 10 mg/g

POLVO PARA ADMINISTRACIÓN EN AGUA DE BEBIDA O EN LECHE

0 días

2 días

CUANDO LAS VÍAS RESPIRATORIAS ESTÁN CONGESTIONADAS Y PRESENTAN FLUIDOS INFLAMATORIOS…

TUDOMAX

- Moviliza la mucosidad
- Mejora el drenaje bronquial
- Recupera la capacidad pulmonar

s.p.® veterinaria

TUDOMAX

10 mg/g

POLVO PARA ADMINISTRACIÓN EN AGUA DE BEBIDA O EN LECHE

Cada g contiene
Bromhexina .....10.00 mg
(como bromhexina clorhidrato.....10.98 mg)

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES:

Porcino, pollos, pavos, patos y bovino (terneros),
Tratamiento mucolítico del tracto respiratorio congestionado.

La bromhexina es un mucoregulador. Por la secreción de las glándulas seromucosas, la bromhexina ayuda a restablecer la viscosidad y elasticidad de las secreciones bronquiales del árbol traqueobronquial. Además, por su acción expectorante facilita la movilización de la mucosidad y permite el drenaje bronquial, permitiendo una mejora de la función y de la capacidad de defensa pulmonar.

TUDOMAX *puede utilizarse junto con antibióticos y/o sulfamidas y broncodilatadores.*



La actividad mucolítica y expectorante de la bromhexina fluidifica las secreciones de la mucosa bronquial y, al mismo tiempo, incrementa la permeabilidad capilar.

Gracias a ésta acción, hay una mejor difusión del antibiótico hacia el tejido pulmonar, obteniendo unas concentraciones mayores en éste área; la secreción local de inmunoglobulinas incrementa también (IgA y IgE principalmente).

La facilitación del contacto de los agentes infecciosos con los antibióticos ayuda a resolver de forma más rápida las infecciones.

POSOLOGIA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administración oral:
0.45 mg de bromhexina por kg de peso vivo, equivalentes a 0.45 g del polvo por 10 kg de peso vivo, administrados diariamente de 3 a 10 días, en el agua de bebida, leche o alimento líquido.

El período de validez después de su disolución en agua son 24 horas. La solubilidad del producto se ha comprobado a la concentración máxima de 45g/L a 20ºC. Se puede observar una fina suspensión en agua fría.

La leche se debe calentar a temperatura de alimentación antes de añadir el polvo.

La leche medicada se debe preparar antes de su administración y consumir antes de 3 horas.

En caso de usar un dosificador automático, ajustar la bomba entre 1 y 5% y adaptar proporcionalmente el volumen de la preparación.

TIEMPOS DE ESPERA:

Porcino
Carne: 0 días.

Pollos, pavos y patos
Carne: 0 días.
Su uso no está autorizado en aves cuyos huevos se utilizan para consumo humano, durante y desde 4 semanas antes del inicio de la puesta.

Bovino (terneros)
Carne: 2 días.
Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano.

Formato: Bolsa de 1 kg.

La información que contiene este folleto ha estado revisada por nuestro equipo técnico y pretende complementar el consejo del profesional veterinario. Para la información completa contacte con nuestros comerciales de zona o a la sección de productos de nuestra página web ***www.spveterinaria.com***

s.p.® veterinaria, s.a.

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4.1• 43330 RIUDOMS (Tarragona) SPAIN
Tel. +34 977 850 170* • Fax +34 977 850 405 • P.O. Box. 60 • Email exportacion@spveterinaria.com
www.spveterinaria.com