Bovino

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS



s.p.® veterinaria

Orales

MEDICAMENTOS SUJETOS A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
EXCEPTO LOS MARCADOS CON (*)

ALBENDEX 20 mg/ml

159-ESP

Albendazol.....2%	Suspensión oral	1 l 5 l	Bovino - 3,7 - 5 ml/ 10 kg p.v., dosis única Ovino - 2,5 - 3,7 ml/ 10 kg p.v., dosis única	**Carne:** Bovino: 14 días Ovino: 10 días **Leche:** 4 días

ALBENDEX 100 mg/ml

160-ESP

Albendazol.....10%	Suspensión oral	100 ml 1 l 5 l	Bovino - 0,75- 1 ml/ 10 kg p.v., dosis única Ovino - 0,5- 0,75 ml/ 10 kg p.v., dosis única	**Carne:** Bovino: 14 días Ovino: 10 días **Leche:** 4 días

ANTHELMIN Polvo para solución oral

130-ESP

Levamisol (clorhidrato).....10%	Polvo soluble	1 kg	Bovino, ovino y porcino - 0,75 g/ 10 kg p.v., dosis única Aves - 2-2,5 g/ 10 kg p.v., dosis única Ver especificaciones	**Carne:** Bovino: 14 días Ovino: 9 días Porcino: 10 días Aves: 7 días **Leche:** no usar **Huevos:** no usar

AQUADOX-S.P. 500 mg/g Polvo para administración en agua de bebida o leche

2274-ESP

Doxiciclina (hiclato).....50%	Polvo oral para administrar en agua de bebida o leche	200 g 1 kg	Terneros - 10 mg de doxiciclina / kg p.v. / día, durante 5 días, (0.2 g/10 kg p.v. ~200 g/1000 L) Porcino engorde - 10 mg de doxiciclina/ kg p.v. / día, durante 5 días, (200 g/1.000 litros) Pollos engorde - 15 mg de doxiciclina/ kg p.v. / día, durante 3-5 días, (150 - 300 g/1000 litros)	**Carne:** Terneros: 7 días Porcino: 2 días Pollos: 7 días **Huevos:** no usar **Leche:** no usar

COLIMICINA S.P. 2.050.000 UI/g Polvo para administración en agua de bebida

966-ESP

Colistina sulfato.....205 MUI/100 g	Polvo soluble	1 kg	Bovino y porcino - 0,5 g/litro o 102.500 UI/kg p.v./día (equivalente a 0,5 g/10 kg p.v.) durante 3 días Pollos y pavos - 0,3 -0,6 g/litro o 123.000 UI/kg p.v./día (equivalente a 0,6 g /10 kg p.v.) durante 3 días.	**Carne:** Terneros: 14 días Porcino: 0 días Pollos: 2 días Pavos: 0 días **Huevos:** 0 días **Leche:** no usar

COLMYC 25 mg/ml Solución oral para terneros

2228-ESP

Enrofloxacina.....2,5%	Solución oral	1 l 5 l	Terneros - 10 ml de Colmyc 25 mg/ml / 50 Kg p.v./ día en agua, leche o lacto reemplazante, durante 5 días (5 mg de enrofloxacina / kg p.v./día).	**Carne:** Terneros: 11 días

ENDOEX Solución oral

176-ESP

Closantel 5%	Solución oral	1 l	Bovino y ovino - 1-2 ml/ 10 kg p.v., dosis única	**Carne:** Bovino: 28 días Ovino: 30 días **Leche:** no usar

ESVEX Corderos y cabritos (*) *No sujeto a prescripción veterinaria*

α ESP43100328

Vitamina E (3a700) .....100 g/1000 ml Selenio (Selenito sódico)(E-8) ..50 mg/1000 ml	Solución oral (pienso complementario de lactancia)	250 ml	Terneros - 0,5-1 ml /kg de pienso de lactación. Corderos y cabritos - 2 ml/ animal en boca. 2 pulsaciones	No precisa tiempo de espera

ESVEX ORAL (*) *No sujeto a prescripción veterinaria*

α EXP43100328

Vitamina E (3a700) .....100 g/1000 ml Selenio (Selenito sódico)(E-8) ..50 mg/1000 ml	Solución oral (pienso complementario)	5 l	Todas las especies - 1 ml/ litro de agua bebida	No precisa

FLUQUINOL 100 mg/ml

821-ESP

Flumequina.....10%	Solución oral	200 ml 5 l	Bovino, ovino-caprino, aves y porcino - 0,6 - 2,5 ml/ litro de agua. Ver especificaciones	**Carne:** 10 días **Leche:** no usar **Huevos:** no usar

GLUCOGEN (*) *No sujeto a prescripción veterinaria*

α ESP43100328

1,2-propanodiol (propilenglicol).....50% Propionato sódico 20%	Solución oral (pienso complementario dietético)	1 l	Bovino - 250 ml/ animal y día, en dos tomas Ovino - 125 ml/ animal y día, en dos tomas	No precisa tiempo de espera

HEPATOREN (*) *No sujeto a prescripción veterinaria*

α ESP43100328

L-Carnitina HCl .....50 g/1000ml DL-Metionina.....15 g/1000ml L-Lisina HCl.....10 g/1000ml Cloruro de Colina .....50 g/1000ml Vitamina B12 .....10 mg/1000ml Manitol .....65 g/1000ml Sorbitol .....100 g/1000ml Cloruro sódico .....100 g/1000ml Cloruro potásico.....75 g/1000ml	Solución oral (Pienso complementario)	100 ml 5 l	Todas las especies - 1 ml/ litro agua	No precisa tiempo de espera

Orales

MEDICAMENTOS SUJETOS A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
EXCEPTO LOS MARCADOS CON (*)

HIDROCOL 4.000.000 UI/ml Solución para agua de bebida / leche

3451 ESP

Colistina (sulfato).....4.000.000 UI/ml	Solución oral	5 l	Bovino, ovino y porcino - 0,25 ml/l de agua o lactoreemplazante/10 kg p.v. durante 3-5 días (equivalente a 100.000 UI de colistina/kg p.v.). Pollos y pavos - 0,1875 ml de Hidrocol/10 kg p.v./día durante 3-5 días (equivalente a 75.000 UI de colistina/kg p.v./día o equivalente 100-200 ml/1000 l agua de bebida).	**Carne:** Bovino, porcino y ovino: 1 día Pollos y pavos: 1 día **Huevos:** 0 días

HIDRO REX VITAL AMINOÁCIDOS S.P. (*) *No sujeto a prescripción veterinaria*

α ESP43100328

Vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina K3, ácido Fólico, ácido Nicotínico, Pantotenato de calcio y Aminoácidos	Solución oral (Pienso complementario)	100 ml 1 l 5 l	Todas las especies - 0,5- 1 ml/ litro de agua ver especificaciones	No precisa tiempo de espera

HIDROTIL 1000 mg/g Polvo

2052-ESP

Tilosina (tartrato).....1.000.000.UI/g	Polvo oral	100 g 500 g	Bovino - 200 g/1000 litros de agua, 7-14 días Aves - 100-500 g/1000 litros de agua, 5 días Porcino - 250 g/1000 litros de agua, 3-10 días	**Carne:** Bovino: 21 días Porcino: 1 día Pollos y gallinas: 0 días Pavos: 5 días **Huevos:** 0 días **Leche:** no usar

NEMICINA Polvo para solución oral 185.000 U.I./g

402-ESP

Neomicina (sulfato).....20%	Polvo soluble	1 kg	Terneros - 0,4-1 g/ litro, 3-5 días Porcino - 1 g/ litro, 3-5 días Equino - 0,2-0,4 g/ litro, 3-5 días Perros - 0,4-1 g/ litro, 3-5 días Aves - 0,5-0,7 g/ litro, 3-5 días	**Carne:** Terneros: 30 días Potros: 20 días Porcino: 20 días Pavos: 14 días Pollos: 5 días **Huevos y leche:** no usar

OSMOLAR ORAL (*) *No sujeto a prescripción veterinaria*

α ESP43100328

Lactosa; dextrosa; cloruro sódico; cloruro potásico; lactato cálcico (E-327) cloruro de colina (3a 890); ácido fólico (3a316), L-lisina (3.2.1.) L-arginina (3 c361)	Polvo soluble (Pienso complementario)	1 kg	Bovino, équidos, porcino, ovino, caprino y conejos - 0,5 - 1 g/ litro agua, 3 días Aves - 2 g/ litro agua, 3 días	No precisa tiempo de espera

OXYGAN 500 mg/g

3954-ESP

Oxitetraciclina.....50 % Excipiente: Ácido Cítrico Anhidro	Polvo oral	1 kg	Pollos, pavos, conejos, porcino, bovino, caprino, ovino y patos - 20 mg de oxitetraciclina / kg de peso vivo / día (equivalente a 400 mg de medicamento / 10 kg de peso vivo) durante 3 a 5 días.	**Carne:** Pollos: 3 días. Conejos: 1 día. Pavos, Porcino, Bovino, Caprino, Ovino y Patos: 7 días. **Huevos:** 0 días

PROPILENGLICOL (*) *No sujeto a prescripción veterinaria*

α ESP43100328

Propilenglicol.....100%	Solución oral (Pienso complementario dietético)	5 l	Bovino (vaca lechera) - 500 ml/ animal/ día Ovino - 250 ml/ animal/ día Resto de especies - 1- 2 ml/kg p.v./ día	No precisa tiempo de espera

RESPIVEX (*) *No sujeto a prescripción veterinaria*

α ESP43100328

Mentol, Tomillo, Eucalipto y otros productos de la transformación de hierbas aromáticas y propilenglicol.	Solución oral (Pienso complementario)	1 l 5 l	Todas las especies: 0,25-0,5 ml/l agua de bebida	No precisa tiempo de espera

REX VITAL AMINOÁCIDOS S.P. (*) *No sujeto a prescripción veterinaria*

α ESP43100328

Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina K3, ácido Fólico, ácido Nicotínico, Pantotenato de calcio y Aminoácidos	Polvo soluble (Pienso complementario)	1 kg	Todas las especies - 0,5- 1 g/ litro agua, durante 5 - 7 días	No precisa tiempo de espera

REX VITAL AMINOÁCIDOS PREMIX S.P. (*) *No sujeto a prescripción veterinaria*

α ESP43100328

Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina K3, ácido Fólico, ácido Nicotínico, Pantotenato de calcio y Aminoácidos	Premezcla	25 kg	Rumiantes, porcino y aves - 1- 2 kg/ t de pienso, durante 1 semana	No precisa tiempo de espera

SOLUCALM (*) *No sujeto a prescripción veterinaria*

α ESP43100328

Cloruro magnésico, Vitamina B6, Nicotinamida, L-Triptófano, Passiflora incarnata, Melissa officinalis	Solución oral (Pienso complementario)	1 l 5 l	Todas las especies - 0,5-1 ml/litro agua de bebida	No precisa tiempo de espera

SULFADIM 250 mg/ml

453-ESP

Sulfadimetoxina (sódica).....25%	Solución oral	100 ml 1 l	Terneros - 2,2 ml/10 kg p.v. 1er día; 1,1 ml/ 10 kg p.v. Del 2º a 5º día. Pollos - 2 ml/litro de agua, durante 6 días. Pavos - 1 ml/litro de agua, durante 6 días. Conejos - 3 ml/litro de agua, 7 días.	**Carne:** Terneros: 28 días Pollos: 8 días Pavos: 28 días Conejos: 28 días **Huevos y leche:** no usar

TUDOMAX 10 mg/g Polvo para administración en agua de bebida o en leche

3517 ESP

Bromhexina (clorhidrato).....1%	Polvo soluble	1 kg	Bovino (terneros), cerdos - 0,45 g/l de agua (0,45 g Tudomax / 10 kg p.v./animal) durante 3-10 días. Pollos, pavos y patos - 300-450 g /1000 l de agua (0,45 g Tudomax / 10 kg p.v. /animal) durante 3-10 días.	**Carne:** Terneros: 2 días Porcino: 0 días Pollos, pavos y patos: 0 días **Huevos y leche:** no usar

Inyectables

MEDICAMENTOS SUJETOS A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

ADEX-3 FORTE

3624 ESP

Vitamina A .....500.000 UI/ml Vitamina D3.....75.000 UI/ml Vitamina E .....50 mg/ml	Solución inyectable	100 ml	Bovino: Terneros - 0,5-1 ml; Novillos: 1-2 ml; Adulto: 3-6 ml. Ovino y caprino: Corderos - 0,25-0,5 ml; Adultos: 0,5-1 ml. Porcino: Lechones - 0,5-1 ml; Adultos:1-2 ml. Dosis única para todas las especies	**Carne:** 28 días **Leche:** 0 días	

ADEX-3 Emulsión inyectable

3645 ESP

Vitamina A .....50.000 UI/ml Vitamina D3.....25.000 UI/ml Vitamina E .....20 mg/ml	Emulsión inyectable	250 ml	Bovino: Terneros: 1 ml/animal/dosis única. Novillos: 1-2 ml/animal/dosis única. Adultos: 2 ml/animal/dosis única. Caballos (potros): 1-2 ml/animal/dosis única. Porcino: Lechones: 0,5 ml/animal/dosis única. Cebo: 1 ml/animal/dosis única. Reproductores: 1ml/animal/dosis única. Ovino y caprino: 1 ml/animal/dosis única.	**Carne:** 28 días **Leche:** 0 días	

AMOXAL 150 mg/ml Suspensión inyectable

3170-ESP

Amoxicilina (trihidrato).....15%	Suspensión inyectable	250 ml	Bovino, ovino, porcino, perros y gatos - 0,66 ml/ 10 kg p.v. Durante un máximo de 5-7 días	**Carne:** Bovino: 46 días Porcino: 16 días Ovino: 46 días **Leche:** no usar	

ANTHELMIN Solución inyectable

61-ESP

Levamisol (hidrocloruro).....7,5%	Solución inyectable	250 ml	Bovino, ovino y porcino - 1ml/ 10 kg p.v. / dosis única Ver especificaciones.	**Carne:** Bovino: 28 días Porcino: 10 días Ovino: 9 días **Leche:** no usar	

CEFAVEX 50 mg/ml Suspensión inyectable para porcino y bovino

2805 ESP

Ceftiofur (hidrocloruro).....5%	Suspensión inyectable	100 ml	Bovino - 1 ml/50 kg p.v./día, durante 3-5 días (s.c.). Porcino - 1 ml/16 kg p.v. /día, durante 3 días. (i.m.).	**Carne:** Bovino: 8 días Porcino: 5 días **Leche:** 0 horas	

DEXAVEX 2 mg/ml Solución inyectable

2693-ESP

Dexametasona.....0,2%	Solución inyectable	50 ml	**Intramuscular:** Bovino y porcino - 1,5 ml/50 kg p.v. se puede repetir cada 24-48 h. Perros y gatos - 0,5 ml/10 kg p.v. se puede repetir cada 24-48 h. **Intravenosa e intramuscular:** Equino - 1,5 ml/50 kg p.v. se puede repetir cada 24-48 h.	**Carne:** Bovino: 8 días Porcino: 2 días Equino: 8 días **Leche:** Bovino: 72 horas Yeguas: no usar	

ENDOEX Solución inyectable

177-ESP

Closantel 5%	Solución inyectable	250 ml	Bovino y ovino - 0,5-1 ml/ 10 kg p.v. en dosis única.	**Carne:** Terneros: 44 días Ovino: 107 días **Leche:** no usar	

ESVEX Emulsión inyectable

3677 ESP

Vitamina E .....150 mg/ml Selenito de sodio .....1,1 mg/ml	Emulsión inyectable	100 ml 250 ml	Bovino (IM): Terneros 2,5- 5 ml/animal, se puede repetir a los 7 días. Adultos 5-10/animal ml. Ovino (SC): Corderos, 0,5-1 ml/animal, se puede repetir a los 7 días. Ovejas, 2-3 ml/ animal. Porcino: Lechones 0,25-0,5ml/ animal, se puede repetir a los 7 días. Cerdas, 4 ml/animal.	Bovino: 14 días Porcino: 14 días Ovino: 30 días	

Inyectables

MEDICAMENTOS SUJETOS A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

FLORVEX 300 mg/ml Soluciòn inyectable para porcino, ovino y bovino

2659-ESP

Florfenicol.....30%	Solución inyectable	100 ml 250 ml	Bovino - **i.m.** - 1 ml/15 kg p.v. 2 veces con un intervalo de 48 h. **s.c.** - 2 ml/15 kg p.v. en dosis única. Porcino - **i.m.** - 1 ml/20 kg p.v. 2 veces con un intervalo de 48 h. Ovino - **i.m.** - 1 ml/15 kg p.v. día durante 3 días.	**Carne:** Bovino: Intramuscular; 30 días Subcutáneo: 44 días Porcino: 18 días Ovino:39 días **Leche:** no usar	

FLOXAVEX 100 mg/ml Solución inyectable para porcino y bovino

2277-ESP

Enrofloxacino.....10%	Solución inyectable	100 ml 250 ml 500 ml	Bovino (IV) (SC) - 1 ml/ 20 kg p.v. día, durante 3-5 días. Porcino (IM) - 0,5 - 1 ml/20 kg p.v. día, durante 3 días.	**Carne:** Bovino: Subcutáneo; 12 días. Intravenoso: 5 días Porcino: 13 días **Leche:** Bovino: Subcutáneo; 4 días Intravenoso: 3 días	

FLUVEX 50 mg/ml Solución inyectable para porcino, bovino y equino

1755-ESP

Flunixino (meglumine).....5%	Solución inyectable	100 ml 250 ml	Bovino - 2 ml/ 45 kg p.v. día. Porcino - 2 ml/ 45 kg p.v. día. Equino - 1 ml/ 45 kg p.v. día.	**Carne:** Bovino: 4 días Porcino: 28 días Équidos: 4 días **Leche:** 24 horas	

GENTAVIN 100.000 UI/ml Solución inyectable

2584-ESP

Sulfato de Gentamicina ...100.000 UI/ml	Solución inyectable	100 ml 250 ml 500 ml	Terneros de hasta 13 semanas - 0,2 ml// 10 kg p.v. , 2 veces al día durante 3 días.	**Carne:** Terneros: 139 días **Leche:** no usar	

HEMOCARB 85 mg/ml Solución inyectable

3813-ESP

Imidocarbo .....85 mg (como dipropionato de imidocarbo 121,15 mg)	Solución inyectable	20 ml 50 ml	Bovino (SC) - Piroplasmosis: -Prevención: 0,023 ml/kg p.v. dosis única (equivale a 2 mg Imidocarbo /kg p.v.) -Tratamiento: 0,01 ml/kg p.v. dosis única (equivale a 1 mg Imidocarbo/kg p.v.). Anaplasmosis: -Tratamiento: 0,025 ml/ kg p.v. dosis única (equivale a 2,1 mg/kg p.v.). Perros (IM, IV) - 0,047-0,058 ml/kg p.v. dosis única (equivale a 4-5 mg/kg p.v.).	**Carne:** 213 días **Leche:** 6 días	

IVERTOTAL 10 mg/ml Solución inyectable

2937-ESP

Ivermectina.....1%	Solución inyectable	250 ml 500 ml	Bovino (SC) - 1 ml/ 50 kg p.v., en dosis única. Ovino (SC) - 0,5 ml/25 kg p.v. en dosis única. Corderos menos 20 kg: 0,1 ml/5 kg p.v. Porcino (SC) - 1,5 ml/50 kg p.v. Lechones menos 16 kg: 0,1 ml/3 kg p.v.	**Carne:** Bovino: 49 días Porcino: 28 días Ovino: 42 días **Leche:** no usar	

LINCEX Solución inyectable

2627 ESP

Espectinomicina (sulfato)... 100 mg/ml Lincomicina (Hidrocloruro) ....50 mg/ml	Solución inyectable	250 ml 500 ml	Bovino (terneros prerumiantes): Intramuscular: (2 ml/10 kg p.v./3-5 días Porcino: Intramuscular: 2 ml/10 kg p.v./3-5 días. Perro: Intramuscular: 2 ml/10 kg p.v./3-5 días.	**Carne:** 21 días **Leche:** no usar	

MARBOCOLI 100 mg/ml Solución inyectable bovino y porcino

3151-ESP

Marbofloxacino.....10%	Solución inyectable	100 ml 250 ml	Bovino - **Infecciones respiratorias** (8 mg/kg p.v.): 2 ml/25 kg p.v. dosis única(IM). **Infecciones por My.bovis** (2 mg/ kg p.v.): 1 ml/50 kg p.v. día, durante 3-5 días (IM,SC). **Mastitis aguda** (2 mg/kg p.v.): 1ml/50 kg p.v., durante 3 días (IM,SC). Cerdos de engorde y cerdas adultas -1 ml/50 kg p.v. día, durante 3 días (IM).	**Bovino:** · 8 mg/kg única inyección (IM): Carne: 3 días Leche: 72 h. · 2 mg/kg de 3 a 5 días (IV/SC/IM): Carne: 6 días Leche: 36 h. **Porcino:** Carne: 4 días.	

La información contenida en este folleto ha sido revisada por nuestro equipo técnico como soporte del equipo comercial para el clínico veterinario.

Inyectables

MEDICAMENTOS SUJETOS A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

MYCOFLOR 300 mg/ml Solución inyectable bovino y porcino

2417-ESP

Florfenicol 30%	Solución inyectable	250 ml	Bovino - 1 ml/ 15 kg p.v., 2 veces con un intervalo de 48 h. Porcino - 1 ml/ 20 kg p.v., 2 veces con un intervalo de 48 h.	**Carne:** Bovino: 34 días Porcino: 18 días **Leche:** no usar

OSMOLAR SOLUCIÓN INYECTABLE

3965-ESP

Glucosa (monohidrato).....50 mg Cloruro de sodio .....4,9 mg Cloruro de potasio.....0,740 mg Cloruro de calcio dihidrato ....0,367 mg Cloruro de magnesio hexahidrato.....0,300 mg	Solución inyectable	250 ml	Bovino - 100 - 250 ml. / animal Porcino y ovino - 25 - 50 ml. / animal	**Carne:** 0 días **Leche:** 0 días

OXIVEX

2254-ESP

Oxitocina .....10 UI/ml	Solución inyectable	100 ml 250 ml 500 ml	**Obstetricia** Vacas - 7,5-10 ml/vaca. Cerdas - 3-5 ml/cerda. Yeguas - 7,5-15 ml/yegua. **Eyección láctea.** Vacas y yeguas - 1-2 ml/animal. Cerdas - 0,5-2 ml/animal.	**Carne:** 0 días **Leche:** 0 días

PENIVEX COMPLEX

942-ESP

Bencilpenicilina procaína... 20MUI/100ml Dihidroestreptomicina (sulfato) 20 g/100ml	Suspensión inyectable	100 ml 250 ml	Bovino, ovino, porcino y equino - 0,3- 0,6 ml/ 10 kg p.v./ día. Perros y gatos - 0,05- 0,1 ml/ kg p.v./ día.	**Carne:** 30 días **Leche:** 3 días Equino: no usar en caballos destinados al consumo humano

QUINOBAL 100 mg/ml Solución inyectable

3776-ESP

Enrofloxacino.....10%	Solución inyectable	100 ml 250 ml	Bovino - 1 ml/ 20 kg p.v./ día (sc, iv lenta) 3-5 días. Porcino - 0,5 -1 ml/20 kg p.v./ día (i.m) 3 días. Ovino y caprino - 1 ml/20 kg p.v. / día (sc) 3 días.	**Carne:** Bovino (IV): 5 d Bovino (SC):12 d Porcino: 13 d Ovino: 4 d Caprino. 6 d **Leche:** Bovino (IV): 3 d Bovino (SC): 4 d Ovino: 3 d Caprino: 4 d

R-COMPLEX-B

ESP3646

Vitamina B1 .....100 mg/ml Vitamina B2 ..... 5 mg/ml Vitamina B6 .....50 mg/ml Vitamina B12 .....0,1 mg/ml Nicotinamida .....150 mg/ml Dexpantenol ..... 5 mg/ml	Solución inyectable	100 ml	Bovino, porcino, ovino y caprino - 1 ml/10 kg p.v. Dosis única	**Carne:** 0 días **Leche:** 0 días

TETRALONG L.A. 200 mg/ ml Solución inyectable

2409-ESP

Oxitetraciclina (dihidrato) 20%	Solución inyectable	100 ml 250 ml	Bovino, ovino y porcino - 1 ml/10 kg p.v./día. Dosis única.	**Carne:** Bovino: 34 días Porcino: 17 días Ovino: 17 días **Leche:** Bovino: 156 h (6,5 días) Ovino: 192 h (8 días)

Para obtener una información completa de cada producto, diríjanse a nuestros comerciales de zona o la sección productos de nuestra página web ***www.spveterinaria.com*** EDICIÓN MARZO 2021.

Inyectables

MEDICAMENTOS SUJETOS A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

TILOVEX

2689-ESP

Tilosina (tartrato).....20 %	Solución inyectable	100 ml 250 ml	Bovino y porcino - 0,5-1 ml/10 kg p.v./día. Durante 5 días.	**Carne:** Bovino: 24 días Porcino: 13 días **Leche:** 108 h (4,5 días)	

TOLFEDOL, 40 mg/ml, solución inyectable para bovino, porcino, perros y gatos

3279-ESP

Ácido tolfenámico.....4%	Solución inyectable	100 ml 250 ml	Bovino: **-Inflamación en procesos respiratorios** (2 mg/kg p.v.) 1 ml/20 kg p.v. (IM) **-Mastitis** (4 mg/kg p.v.)1 ml/10 kg p.v. (IV) dosis única Porcino: 1 ml/20 kg (2 mg/kg p.v.) (IM), dosis única Perros (IM/SC) y gatos (SC): 1 ml/10 kg p.v. dosis única, repetir si es necesario 24-48 h	**Bovino:** IM: Carne: 12 días Leche: 0 días IV: Carne: 4 días Leche: 24 horas **Porcino :** Carne: 16 días	

TRIMACROL GAN

928-ESP

Sulfadiazina (sódica)..... 40% Trimetoprim..... 8 %	Suspensión inyectable	100 ml 250 ml	Bovino, porcino, ovino, caprino y equino - 0,5 ml/10 kg p.v. Máximo 7 días	**Carne:** Bovino: 28 días Porcino, ovino y caprino: 15 días Caballos: 42 días **Leche:** Bovino: 240 h (10 días). Ovino: 180 h (7,5 días). Caprino y caballos: No usar	

ULTRADIAZINE

857-ESP

Sulfadiazina (sódica)..... 20 g/100ml Trimetoprim..... 4 g/100ml	Solución inyectable	100 ml 250 ml	Bovino, ovino, caprino y porcino - 1 ml/ 10 kg p.v., tratamiento hasta 2- 3 días después de la desaparición de los síntomas. Máximo 7 días	**Bovino:** Carne: (IM) 6 días, (IV) 15 días. Leche: (IV) 2 días. **Porcino:** Carne: 7 días. **Ovino:** Carne: (IM) 3 días, (IV) 15 días. Leche: (IM) 2,5 días. **Caprino:** Carne: (IM) 5 días, (IV) 15 días. Leche: 2,5 días.	

Intramamarias

BICLOX SECADO

2821 ESP

Cloxacilina (benzatina).....500 mg/5g	Pomada intramamaria	· Blíster 15 x 4 jeringas de 5g. · Caja 60 jeringas de 5g. · Estuche 1 x 4 jeringas de 5 g.	Bovino - 1 jeringa/ cuarterón. Ovino y caprino - 1 jeringa/ pezón.	**Bovino:** Carne: 28 días Leche: 2 días tras el parto con periodo secado > 30 días y 32 días tras el tratamiento con periodo de secado ≤ 30 días. **Ovino y caprino:** Carne: 28 días Leche: 4 días tras el parto con periodo secado > 45 d, 7 días tras el parto con periodo secado entre 30 y 45 días y 37 días tras el tratamiento con periodo secado ≤ 30 días	

Tópicos

DELTAVEX POUR-ON

2578 ESP

Deltametrina.....0.75 %	Emulsion para unción dorsal continua	150 ml 500 ml 1 l 2,5 l	Ectoparasiticida para el control de parasitosis externas producidas por las moscas, mosquitos, garrapatas y piojos. Bovino - 10-75 ml/animal dosis única Ovino - 10 ml/animal dosis única Aplicaciones cada 4-8 semanas	**Carne:** Bovino:18 días Ovino: 35 días **Leche:** Bovino:12 horas Ovino: 11 horas	

INSECTIVEX

798 ESP

Cipermetrina (55:45).....50 mg/ml	Solución insecticida en emulsion para pulverización cutánea (uso tópico)	250 ml 1 l	Ectoparasiticida para el control de parasitosis externas producidas por moscas y piojos. Bovino y equino - 1 l/50 l de agua para pulverización tópica.	**Carne:** Bovino: 1 día **Leche:** 0 horas Equino: no usar en caballos destinados al consumo humano.	

Sprays

MEDICAMENTOS NO SUJETOS A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
EXCEPTO LOS MARCADOS CON (*)

ALUMINIUM SPRAY

563-H

Aluminio micronizado .....120 g (contenido neto)	Spray	270 ml	Mamíferos - Aplicar una fina capa a unos 20 cm. de distancia	No precisa tiempo de espera	

DERMOVEX S.P.

1159-H

Aceite de ricino.....300 mg/ml Azufre.....1,2 mg/ml Aceite rosa mosqueta .....125 mg/ml	Aerosol tópico	335 ml	Bovino, ovino, caprino, porcino, equino, conejos y perros - Aplicar durante 1 o 2 segundos sobre la superficie de la piel limpia a proteger, manteniendo el envase a unos 20 cm de la piel. La aplicación del producto puede repetirse diariamente, a voluntad según las necesidades.	No precisa tiempo de espera	

LARVAL S.P.

1098-P

Cipermetrina..... 5 mg por ml	Spray	405 ml	Insecticida-acaricida en spray para el control de insectos rastreros y voladores en instalaciones ganaderas y medios de transportes animales.	No precisa	

TOPISAL 20 mg/ml (*) *Medicamento sujeto a prescripción veterinaria*

2002-ESP

Clortetraciclina (hidrocloruro)...2 g/100ml Azul patente V (E- 131).....0,24 g/100ml.	Spray para pulverización cutánea	405 ml	Bovino, ovino, caprino y porcino - Pulverizar 2- 5 seg. a 15 - 20 cm de distancia sobre la lesión cutánea o herida quirúrgica.	**Carne:** 0 días **Leche:** 0 días	

s.p.® veterinaria, s.a.

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4.1• 43330 RIUDOMS (Tarragona) • Tel. +34 977 850 170* • Fax +34 977 850 405 • Ap. Correos, 60
www.spveterinaria.com