

Flunixin Meglumine 5% Fluvex

ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDEO


SOLUCIÓN  INYECTABLE



I N F L A M A C I Ó N




CALOR-RUBOR



TUMEFACCIÓN



DOLOR



PÉRDIDA
DE FUNCIÓN



Viales de polipropileno
translúcido estéril de 100 y 250 ml

IRRROMPIBLES



Indicados para soluciones parenterales,
ligeros, seguros y de fácil manejo.

 **s.p.[®] veterinaria**

Flunixin Meglumine 5% Fluivex

ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDEO

SOLUCIÓN INYECTABLE



Volvemos con la
**respuesta
inmediata**

**Eficacia
en menos
de ¡15 minutos!**



COMPOSICIÓN

Flunixin meglumine.....
50 mg/ml

INDICACIONES

Bovino: Control de la inflamación y la pirexia y/o el dolor asociado con enfermedad respiratoria, gastrointestinal y mastitis.

Caballos: Control de la inflamación, pirexia y/o el dolor asociados con los trastornos musculoesqueléticos o en el caso de cólico.

Porcino: Recomendado como terapia adyuvante en el tratamiento del síndrome metritis – mastitis –agalaxia (MMA) en cerdas adultas.

POSOLOGÍA

Bovino: 2 ml/45kg p.v. IV.

Caballos: 1 ml/45kg p.v. IV.

Porcino: 2 ml/45kg p.v. IM.

TIEMPOS DE ESPERA

Bovino: Carne: 4 días Leche: 1 día.

Caballos: Carne: 4 días Su uso no está autorizado en yeguas cuya leche se utiliza para consumo humano.

Porcino: Carne: 28 días.

PRESENTACIÓN

Viales de polipropileno 100 ml y 250 ml.

 **s.p.® veterinaria, s.a.**

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4.1 • 43330 RIUDOMS (Tarragona) • Tel. +34 977 850 170* • Fax +34 977 850 405 • Ap. Correos, 60
www.spveterinaria.com

La información que contiene este folleto ha estado revisada por nuestro equipo técnico y pretende complementar el consejo del profesional veterinario. Para la información completa contacte con nuestros comerciales de zona o a la sección de productos de nuestra página web www.spveterinaria.com