



s.p. veterinaria, s.a.

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 - Ap. Correos, 60
Teléfono 977 850 170* - Fax 977 850 405 - 43330 RIUDOMS (Tarragona)

FICHA TÉCNICA

1. **NOMBRE:** ESVEX 150 mg/ml + 1,1 mg/ml EMULSIÓN INYECTABLE Registro nº 3677

2. **COMPOSICIÓN:**

Cada ml contiene:

Principios activos:

Acetato de todo-rac α -tocoferilo (vitamina E)	150 mg
Selenito sódico	1,1 mg
(Equivalente a 0.5 mg de selenio)	

Excipientes:

Alcohol bencílico (E1519)	20 mg
Otros excipientes, c.s.	
Emulsión de color blanco lechoso	

3. **ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES:**

Bovino, ovino y porcino, tratamiento y prevención de estados carenciales de vitamina E y selenio.

4. **POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MOSO Y VIAS DE ADMINISTRACIÓN:**

Vía intramuscular.

Bovino:

Prevención:

Terneros: 2,50 ml de medicamento/animal (equivalente a 375 mg de vitamina E y 2,75 mg de selenito de sodio), se puede repetir a los 7 días.

Adultos: 10 ml de medicamento/animal (equivalente a 1,5 g de vitamina E y 11 mg de selenito de sodio), 30 días antes del parto para prevenir la deficiencia en los terneros.



Tratamiento:

Terneros: 5 ml de medicamento/animal (equivalente a 750 mg de vitamina E y 5,5 mg de selenito de sodio), repetir a los 7 días.

Ovino:

Prevención:

Corderos: 0,5 ml de medicamento/animal (equivalente a 75 mg de vitamina E y 0,55 mg de selenito de sodio), se puede repetir a los 7 días.

Ovejas: 2 – 3 ml de medicamento/animal (equivalente a 300 mg – 450 mg de vitamina E y 2,2 – 3,3 mg de selenito de sodio), 30 días antes del parto para prevenir la deficiencia en los corderos.

Tratamiento:

Corderos: 1 ml de medicamento/animal (equivalente a 150 mg de vitamina E y 1,1 mg de selenito de sodio), repetir a los 7 días.

Porcino:

Prevención:

Lechones: 0,25 ml de medicamento/animal (equivalente a 37,5 mg de vitamina E y 0,275 mg de selenito de sodio), se puede repetir a los 7 días.

Cerdas: 4 ml de medicamento/animal (equivalente a 600 mg – 450 mg de vitamina E y 4,4 mg de selenito de sodio), 1 mes antes del parto para prevenir la deficiencia en los lechones.

Tratamiento:

Lechones: 0,5 ml de medicamento/animal (equivalente a 75 mg de vitamina E y 0,55 mg de selenito de sodio), repetir a los 7 días.

5. TIEMPO DE ESPERA:

Carne:

Bovino: 14 días

Porcino: 14 días

Ovino: 21 días

Leche: su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano.

6. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

7. PRESENTACIÓN:

Caja con 1 vial de 100 ml.

Caja con 1 vial de 250 ml.

Agitar bien el envase antes de su empleo.