



s.p. veterinaria, s.a.

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 - Ap. Correos, 60
Teléfono 977 850 170* - Fax 977 850 405 - 43330 RIUDOMS (Tarragona)

FICHA TÉCNICA

1. **Nombre:** SULFAPRIM S.P. PREMEZCLA Registro nº 2134
Premezcla medicamentosa para piensos

2. **Composición:**

Sulfadiazina	250mg
Trimetoprima	50mg
excipiente c.s.p.	1g

3. **Especies de destino e indicaciones terapéuticas:**

Porcino: Tratamiento del síndrome metritis-mamitis-agalaxia(MMA) causada por microorganismos sensibles a la sulfadiazina y trimetoprima, rinitis atrófica y diarrea causada por *Escherichia coli*.

Contraindicaciones:

No administrar a animales con:

- Historial conocido de hipersensibilidad a las sulfamidas o a los inhibidores de la dihidrofolato reductasa.
- Insuficiencia renal o hepática.

4. **Posología y modo de administración:**

Administrar vía oral , en el pienso a razón de 25mg de sulfadiazina y 5mg de trimetoprima/kg de peso vivo/día durante 5 días, constituyendo este pienso medicado la única ración durante este período.



Generalmente esta dosis se obtiene incorporando 500/100mg de sulfadiazina/trimetoprima por Kg de pienso (equivalente a 2Kg de premezcla / Tm de pienso) asumiendo que un cerdo come el 5% de su peso corporal en pienso.

El medicamento se puede administrar en pienso harina y granulado.

Condiciones recomendadas de granulación:

Temperatura no superior a 75°C y una humedad inferior a 15%.

5. **Tiempo de espera:**

Carne: 5 días

6. **Precauciones especiales de uso:**

Ante cualquier proceso infeccioso es recomendable la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la realización de una prueba de sensibilidad de la bacteria causante del proceso.

Durante el tratamiento debe asegurarse que el animal recibe suficiente cantidad de agua de bebida.

7. **Precauciones especiales de seguridad que deberá tomar la persona que administre o manipule el medicamento.**

Las personas que manipulen este medicamento deben tomar las precauciones necesarias para evitar el contacto directo con la preparación. Se recomienda la utilización de mascarillas y otros equipos protectores durante la manipulación de esta premezcla.

8. **Condiciones especiales de conservación:**

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

Periodo de validez después de abierto el envase: 3 meses

Periodo de validez después de su incorporación al pienso: 45 días.

10. **Presentación:**

Envases de 25 Kg